Snabbreferensguide

För patientnära testning

För användning med CardioChek® Plus analysatorer version 1.12 eller senare

CardioChek® Plus Testsystem

Köra ett test

Lipid Panel + eGLU

Varningar och försiktighetsåtgärder (blodburna patogener) Viktiga säkerhetsanvisningar:

1. Användare bör iaktta standardiserade försiktighetsåtgärder vid hantering eller användning av denna analysator. Alla delar av systemet för patientnära testning ska betraktas som potentiellt smittfarliga och är kapabla att överföra blodburna patogener mellan patienter och sjukvårdspersonal. Mer information finns i "Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 2007", http://www.cdc.gov/hicpac/ 2007ip/2007isolationprecautions.html.
2. Analysatorn ska rengöras och desinficeras efter användning på varje en patient. Systemet får endast användas för att testa flera patienter om standardiserade försiktighetsåtgärder och tillverkarens desinfektionsprocedurer följs.
3. Endast engångsinstrument med automatisk inaktivering får användas med denna analysator.

Se bruksanvisningen till CardioChek Plus system för patientnära testning och följ procedurerna för rengöring och desinfektion samt läs övrig information.

pts Diagnostics

Polymer Technology Systems, Inc.
4600 Anson Boulevard
Whitestown, IN 46075 USA
+1-317-870-5610

CardioChek, PTS Panels, MEMo Chip och PTS Collect är varumärken som tillhör Polymer Technology Systems, Inc. Alla andra varumärken och produktnamn är deras respektive ägares egendom. © 2022 Polymer Technology Systems, Inc.

1 Jämför lotnummer

Säkerställ att lotnumren på MEMo Chip® och testremseampullerna överensstämmer.



2 Slå på analysatorn

PATIENT TEST är markerat i huvudmenyn. Tryck på Enter för att välja. Sätt in MEMo Chip. Lotkoden visas kort och måste överensstämma med testremsepartiet.







3 Sätt in båda testremsorna



4 Utföra finger stick



5 Applicera blod på spetsen av PTS Panels® eGLU testremsa



6 Torka bort överflödigt blod



7 Samla prov

PTS Collect™ kapillärrör (volym 40 µl) visas endast som ett exempel.

8 Applicera blod på PTS Panels Lipid Panel testremsa

Observera! Håll kapillärröret rakt och ovanför Lipid Panel-testremsan medan provet appliceras. Vidrör inte testremsans yta med kapillärrörets spets.



9 Läs resultat





PTS Panels eGLU testremsa

Köra ett test

eGLU

1 Jämför lotnummer

Säkerställ att lotnumren på MEMo Chip och testremseampullerna överensstämmer.



2 Slå på analysatorn

PATIENT TEST är markerat i huvudmenyn. Tryck på Enter för att välja. Sätt in MEMo Chip. Lotkoden visas kort och måste överensstämma med testremsepartiet.



3 Sätt in eGLU-testremsan



4 Utföra finger stick



5 Applicera blod på spetsen av PTS Panels eGLU testremsa



6 Läs resultat



PTS Panels Lipid Panel testremsa

PTS Panels® Lipid Panel testremsor visas som referens för reflektans

Köra ett test

Reflektans

1 Jämför lotnummer

Säkerställ att lotnumren på MEMo Chip och testremseampullerna överensstämmer.



2 Slå på analysatorn

PATIENT TEST är markerat i huvudmenyn. Tryck på Enter för att välja. Sätt in MEMo Chip. Lotkoden visas kort och måste överensstämma med testremsepartiet.



3 Sätt in reflektanstestremsan



4 Utföra finger stick

Torka bort överflödigt blod.



5 Samla upp prov

PTS Collect kapillärrör (volym 40 µl) visas endast som ett exempel.

6 Applicera blod på reflektanstestremsan

Observera! Håll kapillärröret rakt och ovanför reflektanstestremsan medan provet appliceras. Vidrör inte testremsans yta med kapillärrörets spets.

7 Läs resultat